

ЭПРИМЕК®

Препарат для лечения и профилактики паразитарных заболеваний у животных

Состав: эприномектин 1%



Препарат Эпримек® назначают:

- **крупному рогатому скоту, овцам, козам, оленям и верблюдам** — при нематодозах: диктиокаулез, трихостронгилятозы, стронгилоидоз, аскаридатозы, буностомоз, телязиоз; при гиподерматозе, эстрозе, псороптозе, саркоптозе, сифункулятозе, маллофагозе, а также для борьбы с падальными и мясными мухами;
- **лошадям** — при стронгилятозах, параскаридозе, оксиурозе, саркоптозе и гастрофилезе;
- **свиньям** — при аскаридозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, стефанурозе, метастронгилезе и других нематодозах; при саркоптозе и вшивости;
- **песцам и лисицам** — при токсокарозе, токсаскаридозе, анкилостомозе и унцинариозе, саркоптозе и отодектозе, нотоэдрозе, демодекозе и поражении блохами, а также для профилактики диروفилляриоза.



www.apicenna.ru



[apicenna_veterinary](https://www.instagram.com/apicenna_veterinary)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

ЭПРИМЕК® вводят животным с соблюдением правил асептики и антисептики.

- **Крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, оленям и верблюдам** — подкожно или внутримышечно 1 мл препарата Эпримек на 50 кг веса животного (200 мкг действующего вещества на 1 кг веса).
- **Свиньям** — внутримышечно 1 мл препарата Эпримек на 33 кг массы животного (300 мкг действующего вещества на 1 кг массы) однократно. В случае если объем вводимого раствора составляет более 10 мл, его следует вводить животному в несколько мест.
- **Песцам и лисицам** — подкожно или внутримышечно из расчета 0,2 мл препарата на 10 кг массы животного (200 мкг действующего вещества на 1 кг веса).

Против нематод препарат применяют животным перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Убой на мясо крупного рогатого скота проводят не ранее чем через 8 суток, свиней — не ранее чем через 28 суток после последнего введения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки.

Молоко можно использовать в пищевых целях без ограничений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Возможность применения
комрящим самкам.



Отсутствие аналогов
российского производства.



Широкий спектр действия.



Без выбраковки
по молоку.



Отсутствие резистентности
у паразитов.



10 мл

100 мл

500 мл