



НЕОМЕКТИН 1%

Препарат для лечения и профилактики паразитарных заболеваний

Состав: ивермектин 1%



Олени



Крупный
рогатый
скот



Овцы



Свиньи

Неомектин 1% назначают животным с лечебно-профилактической целью при арахно-энтомозах и нематодозах:

- **крупному рогатому скоту** при стронгилятозах, диктиоокаулезе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, гиподерматозе, псороптозе, саркоптозе и хориоптозе;
- **овцам** при диктиоокаулезе, протостронгилизе, мюллериозе, гемонхозе, остертагиозе, нематодирозе, маршаллагиозе, кооперизе, хабертиозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, малофагозе, эстрозе, псороптозе;
- **оленям** при диктиоокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, эдемагенозе, цефеномиозе и саркоптозе;
- **свиньям** при трихоцефалезе, аскаридозе, метастронгилизе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, стефанурозе, гематопинозе и саркоптозе.



апіценна®

Ветеринарная фармацевтика

Подписывайтесь на нас в соц. сетях!

www.apicenna.ru

apicenna_veterinary



ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

Неомектин 1% вводят животным внутримышечно однократно с соблюдением правил асептики: свиньям в область шеи и внутренней поверхности бедра, жвачным животным — в область крупа или шеи в следующих дозах:

- **крупному рогатому скоту, овцам и оленям** — 1 мл на 50 кг массы животного (200 мкг ивермектина на 1 кг массы);
- **свиньям** — 1 мл на 33 кг массы животного (300 мкг ивермектина на 1 кг массы).

В тяжелых случаях заболевания животных саркоптоидозами обработку проводят двукратно с интервалом 8 — 10 дней.

В случае если объем вводимого раствора составляет более 10 мл его следует вводить животному в несколько мест.

Обработку животных при нематодозах проводят осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище, против оводовых инвазий — сразу после окончания лёта оводов, против возбудителей арахно-энтомозов — по показаниям.

Каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе (7 — 10 голов) животных. При отсутствии осложнений в течение 3-х дней приступают к обработке всего поголовья.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Убой на мясо жвачных животных и свиней разрешается не ранее чем через 28 суток после последнего применения Неомектина 1%. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий спектр действия: нематоды ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и легких; личинки подкожных носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей.
- Однократное внутримышечное введение.
- Отсутствие местных реакций и раздражения в месте инъекции*.
- Быстрое всасывание из места введения препарата.
- Доступная цена.



* С момента выпуска препарата негативных реакций не зафиксировано