

ПИРОСТОП®

Препарат для лечения и профилактики
кровепаразитарных болезней у животных

Состав: имидакарба дипропионат 12%



Препарат Пиростоп® назначают с лечебной
и профилактической целью при кровепаразитарных
болезнях — бабезиозе, нутталлиозе, анаплазмозе
и смешанных инвазиях:

- крупному рогатому скоту,
- овцам,
- лошадям,
- ослам,
- мулам




10 мл



20 мл



50 мл



100 мл



www.apicenna.ru



[apicenna_veterinary](https://www.instagram.com/apicenna_veterinary)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

- **Крупному рогатому скоту** для лечения и профилактики бабезиоза — 2,0 мл на 100 кг массы животного, анаплазмоза и смешанных инвазий — 2,5 мл на 100 кг массы животного однократно; для устранения состояния носительства — 4,0 мл на 100 кг массы животного двукратно с интервалом 14 дней;
- **Лошадям, ослам и мулам** для лечения и профилактики бабезиоза в дозе 2,0 мл на 100 кг массы животного однократно;
- **Овцам** для лечения бабезиоза, анаплазмоза — 0,2 мл на 10 кг массы животного однократно.


ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Убой крупного рогатого скота, лошадей и овец на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего применения препарата Пиро Стоп®. При вынужденном убое животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Лечение пироплазмоза
путем введения одной инъекции.



Профилактика заражения кровепаразитарными болезнями
в течение 30 дней.



Низкая токсичность
для организма животного.



Готовый раствор
с точными дозировками.

