


САНОФЛАЙ®

Препарат для защиты животных
от двукрылых насекомых

Состав: цифлутрин 1%



10 мл



100 мл



500 мл



1 л

Pour-on

Препарат Санофлай® применяют:

- для обработки крупного и мелкого рогатого скота в пастбищный период;
- для лошадей в период активного лёта насекомых, в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров, мошек и защиты животных от их нападения.

Защитное действие препарата продолжается не менее 28 дней после однократной обработки.



www.apicenna.ru

[apicenna_veterinary](https://www.instagram.com/apicenna_veterinary)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

Крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям массой менее 300 кг Санофлай наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного.

Крупному рогатому скоту и лошадям массой более 300 кг Санофлай наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 10 мл на животное. Обработку животных проводят в пастбищный период, желательно в вечернее время суток, один раз в 4-6 недель, в зависимости от численности насекомых. Дойных животных следует обрабатывать сразу после вечерней дойки.


Перед массовой обработкой поголовья каждую серию препарата Санофлай следует испытать на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение суток приступают к обработке всего поголовья.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Продукцию животноводства после применения препарата Санофлай в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

Не выводится с молоком, применяется на дойном стаде.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Простой и удобный способ защиты продуктивных животных от двукрылых насекомых и иксодовых клещей сроком не менее 28 дней.



Равномерное распределение препарата с места нанесения по всему кожному покрову.



Возможность применения на дойном стаде — не выводится с молоком.



Устойчив к воздействию осадков (дождь).

